ilustaaluutuulaatuuluutuul Juntanlanta

Aytonichi noir (par erreur)

Vass3R03s546-550



SINA Collection Vassal-Montpellier


1540Mtp3

Hetonychi non
VII-8 S2 D









Activities of Activities and Shough 2

There is a series of the consistence of the consis

CLOS TI RANG 8 Souche S2 DESIGNATION: Actomychi moir (faux) CHARGE: Année : 4-9-86 Véraison : maturite: \$ +2 Mill.: 1 Pour.:0 TRAPPE : G - M - P - Dim .: 11 _ L - M - C Vigueur : 1 POFT : érig - 1/2 érig - couché DATE : Année : TG - G - M - P - Dim.: 19 disc.-sph)-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) VEUR : (s) - m - ar - fox - herb. Avec pépins - apyrène 52 2 53 Stible JUS : inc. - coloré

Année: 1970
Emplacement ... VII 8 S.E.... Désignation / Actonychi noir (faux)

	! Nombre ! ! Total !	DATES					
	d'yeux!	23,3	26.3	·	. !		
1	13 1	4 2 ×	2 . !	!	!	!	
2	1 }	!	!	1	!	1	
3	4	1:	2 -	!	1	:	
X		1 1	!	i	į	!	
15	!	!	!	1	!	!	
			10.0	26.3.	nemineme) a	The second secon	

Année: 1975
Emplacement 8 52
Emplacement Désignation Retonychi non

	Nombre	! !		DATE	DATES		
		63	1.10.3	13.3	!	!	!
1	! 4	1	11	!2	!	!	
2	2	0	10	10	!	!	
3	1 2	O	! 0	и.	!!!	!	
×	!		!	i	!	!	
5 }	1			!	1	1 !	

	! Nombre ! Total	!	DATES						
	! d'yeux !	1 15 -3	1183	<u>!</u>	·!	1			
1	! 2	0	! & × !	1	!	!			
2	! 2	! 1	! * * !	1	į	į			
3	! 2	! 0	1 2 * 1	!	!	!			
4	! }	ī Ī	! !	- !	!	i			
5	1	!	!!!!		- !	!			

D & 17.3.76 +1

Fortilité taille courte 83 84 88
Argile Reo Guest 237. 30 6 6 4

ANNEE 1889

HOM AeVonigchi noir (fam.) EMPLACEMENT VII 8 Se

	Nore yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f fin	Véraison début mi/v fin	Maturité
1	2		0				
2	3		0	0			
3	2		0				
X							
Mill		Pourriture :		Port :	mi enige vigueur	: 2	2

Designation: Actoregelic mon (faux)
Clos III Planche 8 Côte 5 Rang 2 Souche (1) = 3 4 5

(A) BOURGEOINE ENT.

Colonne

0

41 - epanoui (1 - moyen 3 - globuleux 3,

41 - glabre 4 * seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - auveteux 8

cotonneux 9

cotonneux 9 de de compart de la compart de l

(D) JOUNES FRUILLES DU MAUTA

etalées 7 - en couttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 siteuses 5 veloutées 6 araneeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanche () fouves on rousses 1 cardinues à liser. orraine o cuivres 4 jounes 5 à plages bronzes 6 entièrement bronzes 7 vertes & autress.

Dans le cas ou la première feuille dutachée est à lisure curmins, la couleur de le se et de la se feuille detrences ser notes.

Calvo 69

Nº ordre

Désignation: Actourelle moir (faux)
Clos III Planche 8 côté 8 rang 2 scuche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonna

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7, duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.)
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 4 tourmenté 5.

- 47 -- blanc 0 fauve ou roux I -- carminé 2 -- à liseré carminé 3.

 cuivi é 4 -- jaune 5 -- à plages bronzées 6 -- entièrement bronzé 7

 vert 3 -- autre 9.
- 48 à péticle glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7.) duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48. totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux (8 / côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.
 - entièrement I partiellement 2,

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Pemelle 5.

Calus 70

Getonýchi nair (fame)

Désignation :

Emplacement: III 8,52 013

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré D - à raics 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré () - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré () - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé Oilabare

52 - bourgeon : coloré D vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo to

Désignation: Actomychi noir (fam.)

Emplacement: WE8824-4

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 petite 1 noyenne 2 grande 3.

 Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Faco inférieuro : nervuros : glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 35 limbe: glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmonté 5.
 - Lobos: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tournenté 5.
- 36 Surface: unio 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 57 Norvuros : Face supérioure : verte 1 point pétiolaire rouge 3 entièrement rouge 4.
- 38 Face inf\(\text{frieure} : \text{verte 1 partiellement rouge 3 enti\(\text{erent rouge 4.} \)
 - Couleur: vort jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéoux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiollement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.
 - angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

-Calvo 74

Emplacement : Désignation :

Actonychi roir.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6:

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacó 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la promière ramification 3.

25 - Arc de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

19 000 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4)- noir (5)

27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2

28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolorc 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3/- moyenne 4 - épaisse 5:

33 - A pulpo charnue 6 - jutcuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spécialo 7:

31 - A pédicelle long (1) - moyenn court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

31 - A bourrolet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrolet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - Do séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 76

```
DENOMINATION: DIL 8 $2 4.1
                                      SARMENT DE VIGHE
                           : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                           : adhérente avec lonticelles (1), résistante so détachant en m lames (2).
 Ecorce
 Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                             autre (4).
                            unie (1), anguleuse (2), striće (5), côtclée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
 Surface
                            : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
 Villosité
                            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
 Nocuds
 : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                             : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4).
                            : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                             : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
  Yeux
```

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvort

Emplacement: VII 8 S2 8 - Angle des nervures (1)-(2)-3. 9 - L₁/L (1) - (2) - 3. 10 - L2/L (1 - 2) 11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 16 - Dents : forme 1 - 2 - 3. 17 - Dents: Méd/B (1) - 2 - 3. 18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3. 19 - Base nerv. (gar. eu dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ XX L'₃ 1 - 2 - 3. 1 - 2 - (3) - 4 - 5. 22 - Largeur S.P. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1 - (2) - 3. : (4) - (5) Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

No diordre : ~

Origine :

Désignation: Actonychi noir (faux)

rugge

Domergue 80